



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันโรคทิวาร์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามที่ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ได้รายงานการระบาดของโรคทิวาร์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) โดยเป็นภัยเงียบชายแดนประเทศไทย และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โรคดังกล่าวไม่ติดต่อถึงคน แต่ก็มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ ในปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนหรือยา ที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เชื้อโรคถูกทำลายได้ยากมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก จังหวัดเชียงราย จึงมีแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

๑.๑ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ และเจ้าของฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ไม่คร�เข้าไปแหล่งที่มีความเสี่ยง เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ หรือฟาร์มสุกรของบุคคลอื่น

๑.๒ เจ้าของฟาร์มต้องทำลายเชื้อโรค ยานพาหนะ เสื้อผ้า รองเท้า และชาระร่างกาย ทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์ม

๑.๓ แยกพื้นที่เลี้ยงสุกรออกจากที่พักอาศัยของคน

๑.๔ ไม่นำเศษอาหารจากครัวเรือนมาเลี้ยงสุกร และการเลือกซื้ออาหารสุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือเลือกอาหารสุกรที่เป็นอาหารสำเร็จรูปแกะออกจากกระสอบที่ใหม่ และสะอาด

๑.๕ ทำความสะอาดโรงเรือน คอก และบริเวณภายในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

๑.๖ หมั่นกำจัดสัตว์พะหนะโรค เป็น นก หนู ฯลฯ และป้องกันสัตว์เลี้ยงมิให้อา舍ียบูร พื้นที่เข้า-ออก บริเวณฟาร์มสุกร

๑.๗ จัดให้มีสถานที่กำจัดหากสัตว์ภายในฟาร์มด้วยการฝังชาดให้ผิด din ลึกไม่ต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร ห้ามน้ำสุกรที่ป่วย หรือตายมาชำแหละแยกจ่าย หรือรับประทาน

๑.๘ ไม่นำฟองพันธุ์จากฟาร์มอื่นเข้ามาผสมพันธุ์ภายในฟาร์ม

๑.๙ หมั่นดูแลสุขภาพสุกร หากพบว่ามีการป่วย-ตาย ตามนิยาม (ระบบฟาร์มสุกรมากกว่า ๕๐ ตัว มีสุกรตายมากกว่า ๕% ใน ๒ วัน หรือเกษตรกรรายย่อย สุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว มีสุกรตาย ๒ ตัว ขึ้นไปใน ๑ วัน) ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ทันที

๑.๑๐ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปศุสัตว์อำเภอท้องที่

๑.๑๑ ติดตามสถานการณ์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด

๒ ประชาชนทั่วไป

๒.๑ ไม่เข้า-ออก ฟาร์มสุกรของบุคคลอื่น

๒.๒ โรคติดล่าปูดูดต่อจากสุกรไม่สูญเสีย การตีนตะพาบสามารถบริโภคน้ำสุกรได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตามควรบริโภคน้ำสุกรที่ปรุงสุกเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเองและครอบครัว

๒.๓ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร หรือซากสุกร ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ปศุสัตว์อำเภอท้องที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจญ ปรัชญ์สุกุล)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันโรคต้อหัวต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามที่ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ได้รายงานการระบาดของโรคต้อหัวต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) โดยพบในทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โรคดังกล่าวไม่ติดต่อสัตว์ แต่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ ในปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนหรือยา ที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เชื้อโรคถูกทำลายได้ยากมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก จังหวัดเชียงราย จึงมีแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

๑.๑ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก พาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ และเจ้าของฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรเข้าไปแหล่งที่มีความเสี่ยง เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ หรือฟาร์มสุกรของบุคคลอื่น

๑.๒ เจ้าของฟาร์มต้องทำลายเชื้อโรค ยานพาหนะ เสื้อผ้า รองเท้า และชั้นร่างกาย ทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์ม

๑.๓ แยกพื้นที่เลี้ยงสุกรออกจากที่พักอาศัยของคน

๑.๔ ไม่นำเศษอาหารจากครัวเรือนมาเลี้ยงสุกร และการเลือกซื้ออาหารสุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือเลือกอาหารสุกรที่เป็นอาหารสำเร็จรูปแกะออกจากกระบวนการสกัดที่ใหม่ และสะอาด

๑.๕ ทำความสะอาดโรงเรือน คอก และบริเวณภายในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

๑.๖ หมั่นกำจัดสัตว์พะน้ำโรค เช่น นก หนู ฯลฯ และป้องกันสัตว์เลี้ยงมิให้อาหารอยู่ หรือเข้า-ออก บริเวณฟาร์มสุกร

๑.๗ จัดให้มีสถานที่กำจัดหากสัตว์ภายในฟาร์มด้วยการฝังชาไธฟวิน ลิกไนเต้ท่าก่อ ๕๐ เทียนติดครัว ห้ามน้ำสุกรที่ป่วย หรือตายมาชำแหละแจกจ่าย หรือรับประทาน

๑.๘ ไม่นำพ่อพันธุ์จากฟาร์มอื่นเข้ามาผสมพันธุ์ภายในฟาร์ม

๑.๙ หมั่นดูแลสุขภาพสุกร หากพบว่ามีการป่วย-ตาย ตามนิยาม (ระบบฟาร์มสุกรมากกว่า ๕๐ ตัว มีสุกรตายมากกว่า ๕% ใน ๒ วัน หรือเกษตรกรรายย่อย สุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว มีสุกรตาย ๒ ตัว ขึ้นไปใน ๑ วัน) ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ทันที

๑.๑๐ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปศุสัตว์อำเภอท้องที่

๑.๑๑ ติดตามสถานการณ์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด